

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário
Total inventory area by N5 land-use classes

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	São Vicente - Agroflorestal <i>Sao Vicente - Agroforestry</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	252.5		100.0
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	—	—	—
Total	252.5		100.0

Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	São Vicente - Floresta <i>Sao Vicente - Forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	1 018.5	(844.9 – 1 192.2)	63.2
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	594.1	(420.5 – 767.8)	36.8
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	—	—	—
Total	1 612.7		100.0


Classificação N5 <i>Land-use classification N5</i>	Uso do solo / Área <i>Land-use class / Area</i>		
	São Vicente - Formação florestal aberta <i>Sao Vicente - Open forest</i>		
	ha	($\alpha = 0.1$)	%
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	55.0	(0.0 – 155.8)	10.0
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp <i>Open scrubby forest with Prosopis sp</i>	495.4	(394.6 – 596.2)	90.0
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	—	—	—
Total	550.4		100.0

4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário (Continued)


Total inventory area by N5 land-use classes (Continued)

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area			
	São Vicente - Área arbustiva Sao Vicente - Shrubland			
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	—	—	—	—
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—	—
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—	—
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—	—
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	—	—	—	—
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	164.9	(0.0 – 1 205.8)	50.0	
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	164.9	(0.0 – 1 205.8)	50.0	
Total	329.8		100.0	

Classificação N5 Land-use classification N5	Uso do solo / Área Land-use class / Area			
	Total			
	ha	($\alpha = 0.1$)	%	
Zona agroflorestal com Prosopis sp. <i>Agroforestry zone with Prosopis sp.</i>	252.5	—	—	9.2
Floresta xerófila com Prosopis sp. <i>Dry forest with Prosopis sp.</i>	1 018.5	(844.9 – 1 192.2)	37.2	
Floresta xerófila baixa com Prosopis sp. <i>Scrubby dry forest with Prosopis sp.</i>	594.1	(420.5 – 767.8)	21.6	
Formação fl. aberta com Prosopis sp. <i>Open forest with Prosopis sp.</i>	55.0	(0.0 – 155.8)	2.0	
Formação fl. aberta baixa com Prosopis sp. <i>Open scrubby forest with Prosopis sp.</i>	495.4	(394.6 – 596.2)	18.0	
Zona arbustiva árida com outras espécies exóticas <i>Dry shrubland forest with other exotic species</i>	164.9	(0.0 – 1 205.8)	6.0	
Zona arbustiva árida com outras espécies endémicas <i>Dry shrubland forest with other endemic species</i>	164.9	(0.0 – 1 205.8)	6.0	
Total	2 745.4		100.0	



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário



4. Classe do uso do solo N5 por área total do inventário